

Conoce nuestro Instituto de Reproducción Asistida, técnicas y equipo médico en [quironsalud.es/reproduccionasistida](http://quironsalud.es/reproduccionasistida)

iera.es   



**IERA - Instituto Extremeño de Reproducción Asistida**  
C/ Julio Cienfuegos Linares 19-21  
06006 Badajoz  
**924 286 962**

**Quirónsalud, la salud persona a persona.**

Más de 100 hospitales, institutos y centros médicos dedicados a tu salud en 13 regiones:  
Andalucía | Aragón | Baleares | Canarias | Castilla La Mancha | Cataluña |  
Comunidad Valenciana | Extremadura | Galicia | Madrid | Murcia | Navarra | País Vasco



Reproducción Asistida

## ¿En qué consiste un ciclo de Inseminación Artificial (IA)?

Instituto de Reproducción Asistida  
Información para el paciente



## Un ciclo de Inseminación Artificial (IA), paso a paso

### Ecografía basal

Tu ginecólogo te realizará una ecografía basal aproximadamente a los 21 días del ciclo previo al inicio de la inseminación para confirmar que todo está dentro de la normalidad y no hay contraindicación para iniciar la estimulación ovárica.



### Inicio de la estimulación ovárica

Si en la visita anterior el estudio ecográfico fue normal, tendrás que empezar con la estimulación ovárica del 3<sup>er</sup> al 5<sup>o</sup> día de regla. Las inyecciones son de administración subcutánea y preferiblemente entre las 20:00 y las 23:00 horas.




### Control de la inseminación

El primer control ecográfico se realiza entre el 5<sup>o</sup> ó 6<sup>o</sup> día de haber empezado con las inyecciones. A partir de aquí los controles son cada 48 horas a menos que tu ginecólogo considere oportuno otro momento.


### Ovulación

Una vez que los folículos han alcanzado un tamaño adecuado, tu ginecólogo te indicará la fecha y hora de la administración de la medicación para la ovulación, como por ejemplo, Ovitrelle® 250. Esto desencadena la ovulación en un plazo de 37-40 horas.



### Inseminación

La introducción intrauterina del semen conyugal/donante se programa un día y medio después de la administración de la medicación para la ovulación y no se necesita anestesia para su realización. La paciente podrá hacer vida normal tras ésta. No es doloroso.



### La prueba de embarazo

Se realiza a las 2 semanas de la inseminación mediante una prueba de sangre.

Los resultados se comunicarán en el mismo día de la prueba así como las indicaciones a seguir.

